



예방접종 필수! 백일해



백일해란?

백일해균 감염에 의한
급성호흡기 질환

감염경로

- 감염된 사람이 기침이나 재채기 등을 할 때 비말을 통해 전파 가능
- 유증상 감염자의 침, 콧물 등이 묻은 물건을 통해서도 간접적으로 전파 가능

주요증상



잠복기

5~21일
(평균 7~10일)



초기(1~2주)

콧물, 눈물, 기침
(가장 전염력 강한 시기)



발작기(4주 이상)

발작성 기침,
“흠”하는 소리



회복기(2~3주)

기침
서서히 감소

환자 및 접촉자 관리

- 1 백일해에 걸리면 감염기간 동안 등교, 등원* 중지하고 집에서 격리합니다.

*등교, 등원 중지기간

- (적정 항생제 복용 시) 투여 후 5일까지 격리
- (치료받지 않는 경우) 기침 멈출 때까지
최소 3주 이상 격리

- 2 백일해 환자와 접촉한 사람은 의료기관을 방문하여 상담 후 예방적 항생제 치료를 고려할 수 있습니다.





예방접종

접종일정에 맞춘 예방접종이 가장 중요합니다!



기초접종

생후 2개월
1차 DTaP

생후 4개월
2차 DTaP

생후 6개월
3차 DTaP



추가접종

생후 15~18개월
4차 DTaP

만 4~6세
5차 DTaP

만 11~12세
6차 Tdap

- 만 12세까지 기초접종 및 추가접종 필수

예방수칙



기침 증상이 있는 경우 마스크 착용하고
의료기관 방문하여 진료 받기




기침예절 실천

기침할 때 옷소매로 입과 코 가리기



올바른 손씻기의 생활화

흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기



실내에서는 자주 환기하기

하루 최소 3회, 매회 10분 이상



씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기