

Q & A

Q3

과량 복용했을 때는 어떻게 해야 하나요?

과량 복용한 경우 식도궤양 예방을 위해 위세척과 약물 치료가 필요할 수 있으므로 바로 병원을 방문합니다.

Q4

어떻게 보관하나요?

이 약은 빛에 노출되면 쉽게 변색되고, 약효가 저하되므로 차광보관이 필요합니다. 원래의 봉투에 담아 건조하고 서늘한 곳(실온)에 보관합니다.

가루약

가루약은 약국에서 조제된 것으로 알약보다 사용기한이 짧습니다. 습기에 약하므로 빛을 피하여 건조한 곳에 보관하며 냉장고에 보관하지 않습니다.

독시사이클린 복용 중
다음과 같은 증상이 나타나는 경우
즉시 의사나 약사와 상의합니다.

» 심한 복통 또는 흉통




» 피부 수포나 발진,
알레르기반응
(가려움, 두드러기,
호흡곤란, 부종)

» 치아 또는 잇몸 착색




발간등록번호
11-1790387-100023-01

환자·보호자용



소아청소년 마크로라이드 불응성 마이코플라스마 페렴 2차 항생제 안전사용가이드

독시사이클린



Q & A

Q1

독시사이클린 복용 후 토했을 때 어떻게 하나요?

약 복용 후 30분 이내 구토하였거나, 구토물에 약이 보이는 경우, 즉시 다시 1회분을 복용합니다. 다음 약은 원래 정해진 시간에 복용합니다.

Q2

정해진 복용 시간을 놓친 경우 어떻게 하나요?

복용했어야 할 시점과 다음번 복용 시점 사이에 중간 지점을 기준으로 '생각난 시점'이 중간 지점보다 이전이면 복용하고, 그 이후라면 다음번 복용 시점에 복용합니다.

약을 건너뛰었다고 해서 다음번 복용 시점에 두 배의 용량을 복용하지 않습니다.



독시사이클린은 어떤 약인가요?

독시사이클린은 마크로라이드 불응성 마이코플라스마 폐렴의 치료에 효과적인 2차 항생제입니다.

독시사이클린은 어떻게 복용하나요?

- ☑ 의료진이 제시한 용량과 용법, 치료기간을 준수합니다.
(증상이 나아지더라도 임의로 중단하지 않고 정해진 기간 동안 끝까지 꾸준히 복용합니다.)
- ☑ 충분한 물과 함께 식사와 상관없이 12시간 간격으로 복용합니다. 다만, **위장장애가 생기는 경우 식사 후 바로 복용합니다.**
- ☑ 약물 복용 후 식도 자극이나 궤양의 위험을 줄이기 위하여 **낮은 자세로 복용하고 바로 눕지 않습니다.**
(약물 복용 후 최소 30분 - 1시간까지 눕지 않습니다.)
- ☑ 칼슘이 함유된 음식이나, **우유, 제산제, 종합비타민제**는 이 약의 흡수를 방해할 수 있으므로 독시사이클린 복용기간 동안 피하거나 2시간 이상의 간격을 두고 복용합니다.

독시사이클린 복용 전 알려야 할 사항이 있나요?

독시사이클린이 충분한 효과를 나타내고 이상반응을 최소화하기 위하여 의사·약사에게 다음의 정보를 알려주세요.

독시사이클린 및 테트라사이클린제 알레르기가 있는 경우

복용중인 약물

- ☑ 기존에 투약 중인 항생제
(아목시실린, 암피실린 등)
- ☑ 건선치료제, 여드름 치료제(레티노이드 제제)
- ☑ 당뇨병 치료제(인슐린 등)
- ☑ 마그네슘제, 아연제, 종합비타민제, 제산제, 위장약, 철분제, 칼슘제
- ☑ 면역억제제(사이클로스포린, 메토트렉세이트)

앓고 있는 질환

- ☑ 간질환, 신장질환
- ☑ 경련성 질환, 신경계 이상, 중증근무력증
- ☑ 당뇨병
- ☑ 식도통과 장애, 식도궤양, 위궤양
- ☑ 천식, 두드러기 등의 알레르기 질환, 전신 홍반 루프스

독시사이클린의 이상반응과 대처 방법을 알려주세요

독시사이클린 복용 후 식욕 부진, 메스꺼움, 구토, 삼킴 곤란, 설염, 설사, 장염 등이 나타날 수 있습니다.



매우 드물게 다음과 같은 이상반응이 나타날 수 있으나, 예방하거나 최소화할 수 있습니다.

독시사이클린은 12세 미만의 소아에서 영구적인 치아 착색, 법랑질 형성 부전 이상반응이 발생할 수 있습니다.

- ☑ **정해진 용량으로 단기간(21일 이하) 복용하는 경우 이상반응 발생 가능성은 매우 낮습니다.**

식도 자극 또는 궤양이 생길 수 있습니다.

- ☑ **가루약으로 복용하는 경우 시럽제에 섞어 먹이는 것으로는 불충분하며, 충분한 물과 함께 복용하십시오.**
- ☑ 위식도 역류 예방을 위해 복용 후 최소 30분 - 1시간 동안은 눕지 않는 것이 좋습니다.



소아청소년 마크로라이드 불응성 마이코플라스마 폐렴 2차 항생제 안전 사용 가이드

독시사이클린

독시사이클린 복용 기간 중 경구 철분제, 비타민제, 칼슘제, 아연제, 제산제, 지사제, 유제품 섭취를 피합니다.

- ☑ 같이 복용할 경우 독시사이클린의 효과가 감소될 수 있습니다.
- ☑ 꼭 복용해야 하는 경우, 독시사이클린과 2시간 이상 간격을 두고 복용합니다.

독시사이클린 복용 기간 중, 과도한 햇빛에 노출될 경우 일시적인 얼굴 홍반 등의 광과민반응이 나타날 수 있습니다.

장시간 실외 활동을 할 때에는 긴옷을 입거나, 외출 전 자외선 차단 크림을 바르면 예방 가능합니다.

위장장애(속쓰림, 거북함)나 설사가 나타날 수 있습니다.

소화불량, 속쓰림 등 위장관 장애가 있는 경우 독시사이클린을 식사 후 바로 복용하면 증상을 완화시킬 수 있습니다.

임의로 제산제나 지사제를 복용하지 말고, 의사나 약사와 상의하십시오.